

junior-angin, lizaki na ból gardła o smaku truskawkowym, wyrób medyczny CE , 8 sztuk.

Skład: Wyciąg z porostu islandzkiego, pantotenu wapnia, kwas askorbinowy, sacharoza, syrop glukozowy, kwas cytrynowy, aromat truskawkowy i koncentraty (jabłko, czarna porzeczka, rzodkiew).

Wskazania do zastosowania: junior-angin lizaki chronią błonę śluzową jamy ustnej i gardła, szczególnie w przypadku bólu gardła. **Stosowanie:** Stosować wyłącznie u dzieci powyżej 3. roku życia, które potrafią bezpiecznie i samodzielnie ssać lizaki. Lizak junior-angin należy ssać powoli co 2-3 godziny, nie należy przekraczać liczby 3 lizaków w ciągu dnia. W czasie ssania lizaka nie należy biegać i skakać.

Przeciwwskazania: Lizaków junior-angin nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. Powiadomienie Prezesa URPLW MiPB o wyrobie medycznym - 12.12.2017.

Wytwórca: HCS HEALTHCARE SUPPLY GMBH

junior-angin, syrop dla dzieci, wyrób medyczny CE, o smaku czereśniowym 100 ml

Skład: wyciąg z porostu islandzkiego, wyciąg z malwy, glukonian cynku, sorbinian potasu, roztwór maltitolu, aromat czereśniowy, aromat ziołowy, woda oczyszczona. **Wskazania do zastosowania:** w suchym, drażniącym kaszlu, bólu gardła oraz w przypadku podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej i gardła, towarzyszącym przeziębieniom. **Stosowanie:** Dzieci od 1 do 6 lat: w zależności od potrzeby 1 raz do 2 razy dziennie po 5 ml junior-angin syrop dla dzieci. Dzieci i młodzież od 7 do 16 lat: 2 razy dziennie po 10 ml junior-angin syrop dla dzieci. **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, nietolerancja substancji słodzącej maltitolu. Powiadomienie Prezesa o wyrobie medycznym 18.03.20. **Wytwórca:** HCS HEALTHCARE SUPPLY GMBH

junior-angin, syrop dla dzieci, wyrób medyczny CE, o smaku czereśniowym 100 ml

Skład: wyciąg z porostu islandzkiego, wyciąg z malwy, glukonian cynku, sorbinian potasu, roztwór maltitolu, aromat czereśniowy, aromat ziołowy, woda oczyszczona. **Wskazania do zastosowania:** w suchym, drażniącym kaszlu, bólu gardła oraz w przypadku podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej i gardła, towarzyszącym przeziębieniom. **Stosowanie:** Dzieci od 1 do 6 lat: w zależności od potrzeby 1 raz do 2 razy dziennie po 5 ml junior-angin syrop dla dzieci. Dzieci i młodzież od 7 do 16 lat: 2 razy dziennie po 10 ml junior-angin syrop dla dzieci. **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, nietolerancja substancji słodzącej maltitolu. Powiadomienie Prezesa o wyrobie medycznym 18.03.20. **Wytwórca:** HCS HEALTHCARE SUPPLY GMBH

junior-angin, tabletki na gardło dla dzieci o smaku truskawkowym, wyrób medyczny CE, 24 tabletki/ 36 tabletek na gardło do ssania

Skład: porost islandzki, pantotenu wapnia, glukonian cynku, sacharoza, syrop skrobiowy, kwas winowy, aromat truskawkowy i koncentraty (jabłko, czarna porzeczka, rzodkiew). **Wskazania do zastosowania:** ochrona błony śluzowej jamy ustnej i gardła, szczególnie przy bólu gardła. **Stosowanie:** Dorośli i dzieci od 4. roku życia: w razie potrzeby co 2-3 godziny jedna tabletki na gardło junior-angin do ssania; nie należy przekraczać dawki 3 tabletek dziennie. Może być stosowany przez dzieci powyżej 4. roku życia, które potrafią bezpiecznie ssać tabletkę. **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Powiadomienie Prezesa o wyrobie medycznym 18.03.20.

Wytwórca: HCS HEALTHCARE SUPPLY GMBH